



**WALA**  
Medicines



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
**01.12.2016 № 1299**  
Реєстраційне посвідчення  
№ **UA/15630/01/01**



**ЗМІНИ ВНЕСЕНО**  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
**15.06.2018 № 1141**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування  
лікарського засобу

**Апіс/Беладона кум Меркурі**

**Склад:**

*діючі речовини:* 10 г гранул містять:  
Apis mellifica ex animale toto G1 Dil.  
D4 0,1 г, Atropa belladonna e fructibus  
ferm 33a Dil. D3 0,1 г, Mercurius solu-  
bilis Hahnemanni Dil. D14 aquos. 0,1 г.  
*допоміжні речовини:* сахароза, лактоза  
моногідрат.

**Лікарська форма.**

Гранули гомеопатичні.  
*Основні фізико-хімічні властивості:*  
від білого до злегка жовтуватих гранул.

**Фармакотерапевтична група.**

Комплексний гомеопатичний лікарський  
засіб.

**Фармакологічні властивості.**

Гомеопатичний лікарський засіб для  
застосовуватися в антропософській  
медицині.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Афтозні виразки на слизовій  
оболонці порожнини рота (афтозний  
стоматит), гнійні висипання (піодермія),  
фурункульоз.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів  
препарату та до бджолої отрути.

**Взаємодія з іншими лікарськими  
засобами та інші види взаємодій.**

Немає даних щодо взаємодії з іншими  
лікарськими засобами та інших видів  
взаємодій.

**Особливості застосування.**

Якщо симптоми залишаються  
незмінними більше 3 днів, якщо є  
задишка, гарячка або якщо кашель  
супроводжується гноем або кров'ю,  
необхідно звернутися до лікаря.

**Цукровий діабет.**

Хворим на цукровий діабет перед  
початком лікування слід звернутися  
за консультацією до лікаря, оскільки  
препарат містить цукрозу.  
Лікарський засіб містить сахарозу,  
лактозу.

Оскільки препарат містить лактозу  
моногідрат, не слід його застосовувати  
при спадковій непереносимості  
галактози, дефіциту лактази Лаппа  
або порушенні мальабсорбції глюкози-  
галактози.

*Застосування у період вагітності або  
годування груддю.*  
Не застосовують.

*Здатність впливати на швидкість  
реакції при керуванні автотранспортом  
або роботі з іншими механізмами.*  
Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Зазвичай дорослим призначають  
8-10 гранул під язик до повного  
розсмоктування 1-3 рази на добу, у  
разі загострення – тимчасово кожні  
1-2 години.

*Тривалість застосування:* лікування  
гострого захворювання має бути  
завершено через 2 тижні. Якщо  
протягом 2-5 днів покращення стану  
не настає, необхідно звернутися до  
лікаря.

Тривалість лікування хронічних  
захворювань потребує консультації з  
лікарем.

**Діти.**

Препарат не застосовують дітям (віком  
до 18 років).

**Передозування.**

Немає даних щодо передозування.

**Побічні реакції.**

У рідкісних випадках бджолоїна  
отрута, яка міститься у препараті,  
може спричинити алергічні реакції,  
такі як транзиторні шкірні висипання  
або діарея.

У такому разі лікування препаратом  
АпісБеладона кум Меркурі слід  
припинити.

**Термін придатності.**

5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при  
температурі не вище 25 °С.  
Зберігати у недоступному для дітей  
місці.

**Упаковка.**

Гранули гомеопатичні по 20 г у  
флаконах № 1.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

ВАЛА Хайльміттель ГмбХ/  
WALA Heilmittel GmbH.

**Місцезнаходження виробника та  
адреса місця провадження його  
діяльності.**

Босслервег, 2,  
73087 Бад Болль,  
Німеччина/  
Bosslerweg 2,  
73087 Bad Boll,  
Germany.

**Дата останнього перегляду.**

15.06.2018



220 005 717/9B

